À retenir

En cas de douleur, rougeur, nodule ou toute modification de peau, il faut en parler avec l'infirmier du prestataire de santé à domicile.

Contacts

Professionnel de santé (Infirmier prestataire) :

Visitez notre site dédié aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson :

www.d-minecare.com/fra

Soins cutanés

MALADIE DE PARKINSON

Ref. 02-2025, date d'édition : 02/2025

EVER PHARMA FRANCE
84 Quai Joseph Gillet, 69004
Tél. 09 72 64 31 00
www.everpharma.com/fra

Intérêt des soins cutanés

Dans le cadre d'un traitement de la maladie de Parkinson, voici quelques conseils de soins cutanés en complément des conseils de votre médecin.

Bien que la solution perfusée soit rapidement absorbée par les tissus sous-cutanés, elle peut s'accumuler sous la peau et causer **des changements cutanés locaux au niveau des sites d'injection** : rougeur, chaleur, sensibilité, démangeaisons, indurations et nodules.

Ces réactions se résorbent avec le temps, mais dans certains cas, ces changements tissulaires peuvent rendre difficile l'insertion du cathéter et gênent l'absorption du médicament.

Le développement des nodules n'est généralement pas un problème important, ni un motif d'arrêt de traitement, mais parfois, s'il est grave, **peut limiter l'absorption du médicament, compromettre les effets thérapeutiques et créer une gêne et/ou une douleur transitoire.**

Vos soins cutanés quotidiens

La formation de nodule peut être prévenue avec une **rotation stricte du site d'injection et une meilleure hygiène de la peau.**

Sites d'injection recommandés :

L'administration du médicament se fait par voie sous-cutanée dans le tissu adipeux.

- l'extérieur des cuisses
- l'abdomen
- les bras
- les omoplates
- flancs
- hanches

Changer de site d'injection à chaque perfusion !

- S'assurer que le site soit éloigné d'au moins 5 cm du site de perfusion précédent et du nombril.
- Ne pas piquer dans un pli cutané ou dans un tissu cicatriciel.
- S'assurer que la peau n'est pas rouge, ne démange pas, n'est pas douloureuse et n'est pas gonflée.
- Un nouveau cathéter est utilisé à chaque injection.
- Toujours piquer avec une aiguille sèche.
- En cas de perfusion sur 24h, changer de site d'injection toutes les 12h.

Trucs et astuces

En préventif :

- **Massage « appuyé »** : pendant 5 minutes après la perfusion pour stimuler la circulation sanguine.
- Utiliser un coussin aux noyaux de cerises.
- Appliquer une **compresse froide** au niveau de l'inflammation de la peau.
- Utiliser un aspi venin pour aider à extraire le surplus de médicament au retrait du cathéter.
- Appliquer une crème anti-inflammatoire, une crème anti-hémorroïdes ... (*attention prescription*)
- **Le geste n'est habituellement pas douloureux, si une douleur est ressentie en se piquant, ne pas hésiter à se repiquer ailleurs.**

Autres conseils spécifiques de votre professionnel de santé :

Choix des cathéters

Le choix de la taille de l'aiguille dépend de la morphologie du patient.

Il existe plusieurs types et tailles de cathéters, se rapprocher de l'infirmier du prestataire de santé à domicile pour le choix le plus adapté en fonction de chaque morphologie.

En cas de nodules, demander conseil à votre professionnel de santé. L'infirmier du prestataire est votre interlocuteur privilégié pour les soins cutanés.